

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

ÉDITION SPÉCIALE

ABONNEMENT ANNUEL :
12 NF

Produits pesticides conseillés en 1962

(Les doses sont exprimées, sauf indications contraires, en grammes de matière active par hl. d'eau).

1 - Liste des Produits homologués

A. - ARBRES FRUITIERS

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Anthronome du pommier :

H.C.H. : 100 g.
Lindane : 12 g.
D.D.T. : 100 g.

Anthronome du poirier :

D.D.T. : 100 g.
Lindane : 12 g.

Carpocapse des pommes et des poires :

Arséniate de plomb : 80 g. d'arsenic.
D.D.T. (produit à 50 % de matière active) : 125 g.
D.D.T. émulsion : 100 g.
D.D.D. : 125 g.
Méthoxychlor : 125 g.
Parathion éthyle : 25 g.
Parathion méthyle : 30 g.
Oléoparathion : 20 g.
E.P.N. : 25 g.
Malathion : 75 g.
Diazinon : 30 g.

Tordeuse orientale du pêcher :

D.D.T. (poudre mouillable à 50 %) : 150 g.
D.D.T. (émulsion) : 120 g.
Parathion : 25 g.
Oléoparathion : 20 g.

Pucerons :

Nicotine : 150 g.
H.C.H. émulsion : 200 g.
Lindane émulsion : 30 g.
Quassia amara (Puceron vert farineux du pêcher).
Parathion éthyle : 20 g.
Parathion méthyle : 30 g.
Malathion : 75 g.
Diazinon : 25 g.
Isolan : 6 g.
Déméton méthyle : 50 g.
Déméton méthyl i : 25 g.
Endothion : 50 g.
Phosphamidon : 20 g.
Morphotion : 50 g.

Acarieus :

Parathion éthyle : 25 g.
Parathion méthyle : 30 g.
Diazinon : 25 g.
E.P.N. : 25 g.
Malathion : 75 g.
Déméton méthyle : 50 g.
Déméton méthyl i : 25 g.
Morphotion : 50 g.
Dichlorophényltrichlorethanol : 50 g.
Chlorfenizon : 50 g.
Chlorbenside : 50 g.
Fenizon : 25 g.
Tetradifon : 25 g.

2. — MALADIES

Tavelures :

Bouillies bordelaise et bourguignonne, Oxychlorure de cuivre. Sulfate basique de cuivre, Oxyde cuivreux.
250 g. de cuivre (dose maximum).
Bouillie sulfocalcique : dose du fabricant.
Soufres micronisés : 600 g. de soufre pur (dose max.).
Captane : 150 g.
Zinèbe : 200 g.
Zirame : 180 g.
Thirame : 200 g.
Thiocyanodinitrobenzène : 135 g.
Dichlone : 50 g.

Oïdium :

Bouillie sulfocalcique : dose du fabricant.
Soufres micronisés : 600 g de soufre pur (dose max.).
Soufres dispersés : 600 g de soufre pur (dose max.).

Cloque du pêcher :

Bouillies bordelaise et bourguignonne : 250 g de cuivre.
Oxychlorure de cuivre : 250 g de cuivre.
Oxydes cuivreux : 250 g de cuivre.
Sulfate basique de cuivre : 250 g de cuivre.
Acétate neutre de cuivre : 1 à 2 kg.
Captane : 125 g.
Zirame : 175 g.
Ferbame : 175 g.
Thirame : 175 g.
Association de zirame et de cuivre : 75 g de zirame et 165 g de cuivre.

3. — TRAITEMENT D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS

Huiles de goudron : 6 à 7 l. 5 de produit commercial suivant la teneur en huile.
Huiles de pétrole : 3 à 4 l. de produit commercial suivant la teneur en huile.
Colorants nitrés : 600 g.
Huiles jaunes : 2 à 3 l. de produit commercial.
Oléoparathions : 1 l. 5 de produit commercial.
Oléomalathions : 3 l. de produit commercial.
Oléodiazinons : 1,250 l. de produit commercial.

REMARQUE : Sur les arbres fruitiers à noyau, les doses d'emploi des huiles de goudron et des huiles de pétrole doivent être réduites de moitié.

B. - VIGNE

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Tordeuses de la grappe :

Pulvérisation :

Arséniate de plomb : 100 à 150 g d'arsenic.
D.D.T. : 50 à 80 g.
Parathion éthyle : 20 g.
Parathion méthyle : 30 g.
Diazinon : 25 g.
Malathion : 75 g.

Poudrage :

D.D.T.
Roténone.
Parathion éthyle.
Parathion méthyle.
Diazinon.
Malathion.

Acariens :

Parathion éthyle: 25 g.
Parathion méthyle: 30 g.
Diazinon: 25 g.
E.P.N.: 25 g.
Malathion: 75 g.
Déméton méthyle: 50 g.
Déméton méthyle i: 25 g.
Dichlorophényltrichlorethanol: 50 g.
Chlorfenizon: 50 g.
Fenizon: 25 g.
Chlorbense: 50 g.
Tétradifon: 25 g.

2. — MALADIES

Mildiou :

Bouillie bordelaise: 500 g de cuivre métal.
Bouillie bourguignonne: 500 g de cuivre métal.
Sulfate basique de cuivre: 500 g de cuivre métal.
Oxychlorure de cuivre: 500 g de cuivre métal.
Oxydes cuivreux: 500 g de cuivre métal.
Acétate neutre de cuivre: 400 à 1.000 g.
Captane: 175 g.
Zinèbe: 250 g.
Association de zinèbe et d'oxychlorure de cuivre: 75 g de zinèbe et 187 g 5 de cuivre.

Oïdium :

Soufres en poudrage.
Soufres mouillables ordinaires (à ajouter à une bouillie bordelaise en raison de l'insuffisance de la tenue en suspension s'ils sont utilisés seuls) 2 kg de soufre pur.
Soufres micronisés: 1 kg de soufre pur.
Soufres dispersés: 1 kg de soufre pur.

3. — TRAITEMENT D'HIVER DE LA VIGNE

Cochenilles :

Huiles de goudron: 6 à 7 l. 5 de produit commercial suivant la teneur en huile.
Huiles jaunes: 2 à 3 l. de produit commercial.
Oléoparathions: 1 l. 5 de produit commercial.
Oléomalathions: 3 l. de produit commercial.
Oléodiazinons: 1.250 l. de produit commercial.

Excoriose :

Huiles jaunes: 2 à 3 l. de produit commercial.
Colorants nitrés: 600 g.
Arsénite de soude: 1.250 g d'arsenic.

Esca :

Arsénite de soude: 1.250 g d'arsenic.

C. - POMMES DE TERRE

Doryphore :

Pulvérisation

Arséniate de plomb: 170 g d'arsenic.
Arséniate de chaux: 140 g d'arsenic.
Arséniate d'alumine naissant: 120 g d'arsenic.
Roténone: 10 g.
D.D.T.: 50 à 80 g.
D.D.D.: 75 g.
Chlordane: 100 g.
Lindane: 8 g.
Dieldrine: 10 g.
Camphènes chlorés: 150 g.
Heptachlore: 60 g.

Poudrage :

Roténone: 100 g de matière active à l'ha
D.D.T.: 1.500 g de matière active à l'ha.
Chlordane: 1.250 g de matière active à l'ha.
Lindane: 100 g de matière active à l'ha.
Dieldrine: 120 g de matière active à l'ha.
Camphènes chlorés: 1.500 g de matière active à l'ha.
Heptachlore: 750 g de matière active à l'ha.

Mildiou :

Bouillies bordelaise et bourguignonne: 500 g de cuivre.
Sulfate basique de cuivre: 500 g de cuivre.
Oxychlorure de cuivre: 500 g de cuivre.
Oxydes cuivreux: 500 g de cuivre.
Zinèbe: 160 g.
Association de zinèbe et d'oxychlorure de cuivre: 60 g de zinèbe et 150 g de cuivre.
Association de zirame et cuivre: 75 g de zirame et 160 g de cuivre.

D. - COLZA

Petite Altise du Colza :

D.D.T. et D.D.D.: 600 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
800 g de matière active à l'ha en poudrage.
H.C.H.: 1.000 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
1.300 g de matière active à l'ha en poudrage.
Lindane: 120 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
160 g de matière active à l'ha en poudrage.
Dieldrine: 200 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
280 g de matière active à l'ha en poudrage.
Parathion: 130 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
180 g de matière active à l'ha en poudrage.

Grosse Altise, Mélégiète :

D.D.T. et D.D.D.:
900 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
1.200 g de matière active à l'ha en poudrage.
H.C.H.: 1.500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
2.000 g de matière active à l'ha en poudrage.
Lindane: 200 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
275 g de matière active à l'ha en poudrage.
Toxaphène et polychlorocamphène:
2.250 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
3.000 g de matière active à l'ha en poudrage.
Dieldrine: 300 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
400 g de matière active à l'ha en poudrage.
Parathion: 200 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
275 g de matière active à l'ha en poudrage.

Charançon des tiges :

H.C.H.: 2.400 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
3.200 g de matière active à l'ha en poudrage.
Lindane: 300 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
400 g de matière active à l'ha en poudrage.
Toxaphène et polychlorocamphane:
4.000 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
5.000 g de matière active à l'ha en poudrage.
Dieldrine: 500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
700 g de matière active à l'ha en poudrage.
Parathion: 300 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
400 g de matière active à l'ha en poudrage.

Charançon des siliques :

Lindane: 500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
600 g de matière active à l'ha en poudrage.
Toxaphène et polychlorocamphane:
4.000 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
5.000 g de matière active à l'ha en poudrage.
Dieldrine: 900 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
1.200 g de matière active à l'ha en poudrage.
Parathion: 500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
600 g de matière active à l'ha en poudrage.

E. - BETTERAVES

Pucerons :

Lindane émulsion: 30 g.
Parathion éthyle: 20 g.
Parathion méthyle: 30 g.
Malathion: 75 g.
Diazinon: 25 g.
Isolan: 6 g.

F. - DESINFECTION FONGIQUE DES SEMENCES DE CEREALES

Carie du blé :

Sels de cuivre.
Produits organo-mercuriques.

Formol.
Hexachlorobenzène.
Quintosène.
Oxyquinoléate de cuivre.
Cuprobame.
Carbatène.

Charbon de l'avoine, Charbon couvert de l'orge :

Formol.
Produits organo-mercuriques.

Helminthosporiose de l'orge :

Produits organo-mercuriques.

Fusariose et septoriose :

Sels de cuivre.
Produits organo-mercuriques.
Oxyquinoléate de cuivre.
Captane.
Thirame.
Dérivés quinoniques.
Cuprobame.

G. - CULTURES LEGUMIERES

Pucerons :

Nicotine : 150 g.
Lindane : 30 g.
Parathion éthyle : 20 g.
Parathion méthyle : 30 g.
Malathion : 75 g.
Diazinon : 25 g.
Isolan : 6 g.

Acariens :

Parathion éthyle : 25 g.
Parathion méthyle : 30 g.

Diazinon : 25 g.
E.P.N. : 25 g.
Malathion : 75 g.
Dichlorophéyltrichloréthanol : 50 g.
Chlorfenizon : 50 g.
Chlorbenside : 50 g.
Fenizon : 25 g.
Tétradifon : 25 g.

**H. - TRAITEMENTS INSECTICIDES
DES SOLS**

Taupins, Vers blancs :

H.C.H. : 15 kg de matière active à l'ha.
Lindane : 1,5 kg de matière active à l'ha.
Chlordane : 8 kg de matière active à l'ha.
Parathion : 10 kg de matière active à l'ha.
Aldrine : 4 kg de matière active à l'ha.
Heptachlore : 3 kg de matière active à l'ha.

Restrictions en ce qui concerne l'H.C.H. :

Les traitements avec des spécialités à base d'H.C.H. ne peuvent être effectués que sur les sols appelés à porter les cultures suivantes :

- Pépinières permanentes (arbres, arbustes, vignes ou plantes ornementales),
- Cultures ornementales et florales permanentes,
- Cultures fruitières et vignes (à condition qu'aucune culture intercalaire ne soit effectuée),
- Jeunes plantations d'essences forestières,
- Houblonnières (à condition que les traitements soient effectués avant leur installation);
- Maïs, si l'assolement ne comprend que le maïs et d'autres céréales.

2 - Liste des Produits en autorisation provisoire de vente

A. - ARBRES FRUITIERS

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Carpocapse des pommes et des poires :

Sevin : 75 g.
Azinphos : 40 g.
Phosphamidon : 20 g.
Diethion : 100 g.

Tordeuse orientale du pêcher :

Sevin : 120 g.
Trichlorfon : 120 g.

Pucerons :

Isochlorthion : 50 g.
Chlordane : 75 g.
Triméthoate : 30 g.
Azinphos : 40 g.
Azidithion : 75 g.
Carbophénouthion : 30 g.
Diethion : 60 g.
Mevinphos : 50 g.
Diméthoate : 30 g.

Acariens :

Chlorobenzilate : 25 g.
Dioxathion : 25 g.
Azinphos : 40 g.
Triméthoate : 30 g.
Diethion : 50 g.
Carbophénouthion : 30 g.
Phenkapton : 20 g.
Dapacryl : 40 g.
Diméthoate : 30 g.

Mouche des fruits :

D.D.T. : 250 g.
Perthane : 175 g.

Méthoxychlor : 250 g.
Malathion : 100 g.
Trichlorfon : 100 g.
Diméthoate : 30 g.
Mercaptophos : 100 g.

2. — MALADIES

Tavelures :

Oxyquinoléate de cuivre : 60 g.
Doguadine : 100 g.
Carbatène : 200 g.
Manèbe : 160 g.

Oïdium :

Dinitrophénylcrotonate : 25 g.

B. - VIGNE

1. — RAVAGEURS ANIMAUX

Tordeuses de la grappe :

Trichlorfon : 100 g.
D.D.D. : 75 g.
E.P.N. : 36 g.
Mevinphos : 50 g.
Azinphos : 40 g.
Sevin : 120 g.
Chlorthion : en poudrage.

Acariens :

Chlorobenzilate : 25 g.
Dioxathion : 25 g.
Azinphos : 40 g.
Triméthoate : 30 g.
Diethion : 50 gr.
Phenkapton : 20 g.
Dapacryl : 40 g.
Carbophénouthion : 30 g.
Diméthoate : 30 g.

Morphotion : 50 g.
Dichlorophényltrichloréthanol : en poudrage.

2. — MALADIES

Mildiou :

Phaltane : 100 g.
Manèbe : 360 g.
Cuprèbe : 250 g.
Association de zirame et de cuivre : 75 g de zirame et 160 g de cuivre.
Association de carbatène et de cuivre : 48 g de carbatène et 144 g de cuivre.
Association de zinèbe et de cuivre (autre qu'oxychlorure) : 75 g de zinèbe et 180 g de cuivre.
Association de métirame de zinc et de cuivre : 80 g de métirame de zinc et 150 g de cuivre.

Oïdium :

Dinitrophénylcrotonate : 30 g.
Dinitrophénylcrotonate : en poudrage.

Black-rot :

Bouillie bordelaise : 500 g de cuivre métal.
Bouillie bourguignonne : 500 g de cuivre métal.
Sulfate basique de cuivre : 500 g de cuivre métal.
Oxychlorure de cuivre : 500 g de cuivre métal.
Oxydes cuivreux : 500 g de cuivre métal.
Acétate neutre de cuivre : 400 à 1.000 g.
Captane : 175 g.
Zinèbe : 250 g.
Association de zinèbe et de cuivre : 75 g de zinèbe et 187,5 g de cuivre.
Association de zirame et de cuivre : 75 g de zirame et 160 g de cuivre.

C. - POMMES DE TERRE

Mildiou :

Phaltane : 100 g.
Cuprèbe : 250 g.
Manèbe : 160 g.
Association de carbatène et de cuivre : 48 g de carbatène et 144 g de cuivre.

Doryphore :

Sevin : 120 g.
Phosphamidon : 25 g.
Chlorthiepin : 35 g.
600 g à l'ha en poudrage.

D. - COLZA

Petite Altise du colza :

Toxaphène et polychlorocamphane :
1.700 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
2.300 g de matière active à l'ha en poudrage.
Malathion : 500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
700 g de matière active à l'ha en poudrage.
Diazinon : 150 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
200 g de matière active à l'ha en poudrage.
Chlorthiepin : 150 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
200 g de matière active à l'ha en poudrage.

Grosse Altise, Mélégithe :

Heptachlore : 750 g de matière active à l'ha en pulvérisation et en poudrage.
Malathion : 700 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
900 g de matière active à l'ha en poudrage.
Diazinon : 220 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
300 g de matière active à l'ha en poudrage.
Chlorthiepin : 250 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
300 g de matière active à l'ha en poudrage.

Charançon des tiges :

Diazinon : 500 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
700 g de matière active à l'ha en poudrage.
Chlorthiepin : 400 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
500 g de matière active à l'ha en poudrage.

Charançon des siliques :

Diazinon : 800 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
1.100 g de matière active à l'ha en poudrage.
Chlorthiepin : 600 g de matière active à l'ha en pulvérisation.
800 g de matière active à l'ha en poudrage.

E. - BETTERAVES

Pucerons :

Déméton méthyle : 50 g.
Déméton méthyl i : 30 g.
Endothion : 50 g.
Phosphamidon : 25 g.
Mevinphos : 50 g.
Morphotion : 50 g.
Diméthoate : 30 g.
Triméthoate : 30 g.
Azinphos : 40 g.
Azidithion : 75 g.
Carbophénothion : 30 g.
Diéthion : 60 g.
Chlorthion : en poudrage.

Mouche de la betterave :

Lindane : 40 g.
Dieldrine : 50 g.
Toxaphène : 200 g.
Chlordane : 125 g.
Heptachlore : 125 g.
Parathion éthyle : 20 g.
Parathion méthyle : 20 g.
Diazinon : 20 g.
Trichlorfon : 50 g.
Azinphos : 40 g.
Endothion : 75 g.
Diméthoate : 30 g.
Phosphamidon : 25 g.
Mevinphos : 40 g.

F. - CULTURES LEGUMIERES

Pucerons :

Chlordane : 75 g.
Isochlorthion : 50 g.
Triméthoate : 30 g.
Azinphos : 40 g.
Mevinphos : 50 g.
Diéthion : 60 g.
Carbophénothion : 30 g.
Chlorthion : en poudrage.

Acariens :

Chlorobenzilate : 25 g.
Dioxathion : 25 g.
Azinphos : 40 g.
Triméthoate : 30 g.
Diéthion : 50 g.
Carbophénothion : 30 g.
Phenkapton : 20 g.
Dichlorophényltrichloréthanol : en poudrage.

Mouche de l'asperge :

Diazinon : 30 g.
Diméthoate : 30 g.
Endothion : 50 g.

(Listes établies par le Service Central de la Protection des Végétaux)

N.B. - Cette note devra être soigneusement conservée les avis s'y reporteront fréquemment au cours de l'année.